CLíNICA VETERINÀRIA
Dra. Mª Conxa Arasa

C/ Ramon Vergés Pauli, 29
43500 Tortosa

Tel. 977 446 271 – Fax 977 445 596
e-mail: mcaa@tinet.cat

LA MOSCA NEGRA

L'època de màxima incidència de picades per mosca negra a animals de companyia comprén principalment els mesos de juny, juliol i agost.

Els animals afectats viuen en el jardí de la casa o solen passejar, acompanyats pels seus amos, per la vora del riu a una de les hores de màxima incidència: al voltant de les vuit de la tarda.

Els casos referits al nostre centre afecten en major mesura a gossos de races i edats diferents, encara que no es circumscriuen a aquesta espècie únicament.

Les lesions es troben principalment en les zones desprotegides de pèl: parpelles, pit, ventre i cara ventral de les extremitats.

Les lesions de pell que presenten van des de màcules (rojors), pàpules (erupcions), i pústules (erupcions amb pus) fins a úlceres (lesions obertes), normalment acompanyades d'inflamació variable, malestar general i molt prurit (picor).

En alguns casos més greus, els animals mostren signes d'hipertèrmia: 39,8º C. (Temperatura normal del gos 38,5º – 39º).

Depenent de la gravetat de cada cas s'instauren tractaments tòpics, a base de pomades antiinflamatòries i antibiòtiques, i/o tractaments per via parenteral a base de prednisolona.

La prevenció de les picades consisteix en l'aplicació de cremes repel·lents i en evitar les zones de màxima incidència de l'insecte durant les hores més crítiques: primeres hores del matí i darreres del dia.

Es té la sospita que, a més de les lesions apuntades, la mosca negra podria ser un nou vector en la transmissió de la Leishmaniosi canina.

Més informació
Further information (biting gnats/midges, black flies, buffalo flies, etc.)